

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

高雄市政府衛生局 函

高雄市醫師公會	
收	114年8月8日
文	字第1213號

801003

高雄市前金區市中一路225號4樓

地址：802511高雄市苓雅區凱旋二路132之1號

承辦單位：疾病管制處

承辦人：吳俐穎

電話：07-7134000#1321

電子信箱：b111565@kcg.gov.tw

受文者：高雄市醫師公會

發文日期：中華民國114年7月31日

發文字號：高市衛疾管字第11438315200號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：宣導圖卡2張

主旨：請各級醫療院所加強登革熱及屈公病TOCC問診，提升通報警覺度，以利及早採取防疫措施，詳如說明段，請查照。

說明：

- 一、依據傳染病防治法第31條及39條辦理。
- 二、登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症皆是由斑蚊傳播的傳染病，依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，今(2025)年全球已逾25萬例屈公病病例，其中以南美洲疫情最為嚴峻，此外，中國廣東省佛山市亦因境外移入個案造成本土疫情爆發，迄今已逾2,800例。
- 三、另有關登革熱疫情，國內上週新增13例境外移入病例，感染國家分別為印尼、越南、泰國、中國廣州等，全國累計106例境外移入登革熱，為近6年同期次高。本市迄今已累計10例境外移入登革熱確診個案，感染國家以印尼為多。
- 四、由於屈公病毒在病媒蚊體內增殖期間較登革熱病毒短，次一波病例發病日於指標個案發病第2天即可能發生，屈公病的病媒蚊與登革熱相同，由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，而屈公病的潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎(特別是手腳的小關節、手腕和腳踝)、頭痛、噁心、嘔吐、

疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹，症狀持續3至7天。
與登革熱不同的是，部分感染屈公病的病人會持續數週的倦怠感，有些患者的關節會痛到無法行動，並持續數週至數月。

五、目前本市屈公病及登革熱境外移入風險攀升，請各級醫療院所針對就診者應落實詢問TOCC，若診治自登革熱/屈公病流行地區返國之民眾或雖未出國但出現以下症狀者，如發燒、頭痛、肌肉關節痛等「任一」疑似登革熱/屈公病症狀者及臨床診斷「疑似登革熱/屈公病」者，應儘速於24小時內立即通報地方衛生主管機關（轄區衛生所），除了執行登革熱快篩檢驗，建請同步進行屈公病通報，以利早期診斷早期介入防疫措施，降低疫情流行風險。

六、請衛生所轉知轄區各級醫療院所針對自流行地區返國或未出國但有疑似症狀之民眾務必進行登革熱及屈公病之通報；副本抄送社團法人高雄市醫師公會、社團法人高雄縣醫師公會轉知會員知悉。

正本：高雄市三民區衛生所、高雄市三民區第二衛生所、高雄市小港區衛生所、高雄市左營區衛生所、高雄市前鎮區衛生所、高雄市苓雅區衛生所、高雄市新興衛生所、高雄市楠梓區衛生所、高雄市鼓山區衛生所、高雄市旗津區衛生所、高雄市鳳山區衛生所、高雄市鳳山區第二衛生所、高雄市大寮區衛生所、高雄市仁武區衛生所、高雄市橋頭區衛生所、高雄市大社區衛生所、高雄市大樹區衛生所、高雄市內門區衛生所、高雄市六龜區衛生所、高雄市永安區衛生所、高雄市田寮區衛生所、高雄市岡山區衛生所、高雄市林園區衛生所、高雄市阿蓮區衛生所、高雄市美濃區衛生所、高雄市茄萣區衛生所、高雄市梓官區衛生所、高雄市鳥松區衛生所、高雄市湖內區衛生所、高雄市路竹區衛生所、高雄市旗山區衛生所、高雄市燕巢區衛生所、高雄市彌陀區衛生所、高雄市甲仙區衛生所、高雄市杉林區衛生所、高雄市茂林區衛生所、高雄市桃源區衛生所、高雄市那瑪夏區衛生所、高雄榮民總醫院、長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院、義大醫療財團法人義大醫院、財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄市立聯合醫院、高雄市立凱旋醫院、高雄市立大同醫院、國軍左營總醫院附設民眾診療服務處、國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處、阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院、高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)、義大醫療財團法人義大癌治療醫院、財團法人台灣省私立高雄仁愛之家附設慈惠醫院、高雄市立民生醫院

副本：高雄市醫師公會、高雄縣醫師公會（均含附件）

擬：1.刊網站.檢書
2.發佈至官方群組
3.轉知會員提醒
胡49君.114.8.8.

局長黃志中

第2頁 共2頁

高雄市醫師公會
理事長陳金順