

副 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

高雄市政府衛生局 函

高雄市醫師公會	
收	年 月 日
文	114.5.-5
字第606號	

地址：802511高雄市苓雅區凱旋二路132
之1號

承辦單位：疾病管制處

承辦人：吳俐穎

電話：07-7134000#1321

電子信箱：b111565@kcg.gov.tw

801003

高雄市前金區市中一路225號4樓

受文者：高雄市醫師公會

發文日期：中華民國114年4月28日

發文字號：高市衛疾管字第11434655800號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：登革熱/屈公病圖卡

主旨：請各級醫療院所加強登革熱及屈公病通報警覺度並加強TOCC
問診，以利及早介入防疫措施，詳如說明段，請查照。

說明：

一、依據傳染病防治法第31條及39條辦理。

二、今(2025)年截至目前累計11例境外移入屈公病病例，為2007年10月列入法定傳染病以來同期新高，感染地以東南亞國家為主，以印尼為多，其次為菲律賓及斯里蘭卡；另有關登革熱方面，國內上週新增2例境外移入病例，感染國家均為印尼，累計44例境外移入登革熱，為近5年來次高，感染國家以印尼為多，其次為菲律賓及越南。

三、屈公病的病媒蚊與登革熱相同，由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，而屈公病的潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎(特別是手腳的小關節、手腕和腳踝)、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。與登革熱不同的是，部分感染屈公病的病人會持續數週的倦怠感，有些患者的關節會痛到無法行動，並持續數週至數月，甚至數年，典型的登革熱則不會出現長期的關節痛；另屈公病較少出現死亡，惟新生兒於出生時感染、

65歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者，是罹患屈公病易有併發症或病況嚴重之風險族群。

四、目前本市屈公病及登革熱境外移入風險持續，請各級醫療院所不論是否為登革熱NSI快篩合約院所，針對就診者應落實詢問TOCC；另病患若出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、後眼窩痛、背痛、噁心、嘔吐、腹瀉、紅疹、長期的關節痛等「任一」疑似登革熱症狀及臨床診斷「疑似登革熱/屈公病」應於24小時內立即通報地方衛生主管機關（轄區衛生所），並建請同時檢驗流感、新冠及登革熱三種快篩以協助診斷，期縮短個案在社區的隱藏期，以利及早介入防疫措施，降低疫情流行風險。

五、請各區衛生所轉知轄區各級醫療院所加強登革熱快篩及通報；副本抄送社團法人高雄市醫師公會、社團法人高雄縣醫師公會轉知會員知悉。

正本：高雄市三民區衛生所、高雄市三民區第二衛生所、高雄市小港區衛生所、高雄市左營區衛生所、高雄市前鎮區衛生所、高雄市苓雅區衛生所、高雄市新興衛生所、高雄市楠梓區衛生所、高雄市鼓山區衛生所、高雄市旗津區衛生所、高雄市鳳山區衛生所、高雄市鳳山區第二衛生所、高雄市大寮區衛生所、高雄市仁武區衛生所、高雄市橋頭區衛生所、高雄市大社區衛生所、高雄市大樹區衛生所、高雄市内門區衛生所、高雄市六龜區衛生所、高雄市永安区衛生所、高雄市田寮區衛生所、高雄市岡山區衛生所、高雄市林園區衛生所、高雄市阿蓮區衛生所、高雄市美濃區衛生所、高雄市茄萣區衛生所、高雄市梓官區衛生所、高雄市鳥松區衛生所、高雄市湖內區衛生所、高雄市路竹區衛生所、高雄市旗山區衛生所、高雄市燕巢區衛生所、高雄市彌陀區衛生所、高雄市甲仙區衛生所、高雄市杉林區衛生所、高雄市茂林區衛生所、高雄市桃源區衛生所、高雄市那瑪夏區衛生所

副本：高雄市醫師公會、高雄縣醫師公會

局長 黃志中

抄：1. 列網站

2. 轉知會員上網參閱

康維敬 5/2025

第2頁 共2頁

高雄市醫師公會
理事長陳金順

0674
1400

爲了您和家人的健康 入內看診前請配合 TOCC



若任一回答爲「有」，請主動告知醫師！

請問您近兩週

1. 有症狀？

發燒、肌肉關節痛、後眼窩痛、背痛、噁心嘔吐腹瀉、紅疹等

2. 有出國？

3. 有被蚊子叮？



4. 住家社區或工作場所所有噴藥？

5. 家人同事同學有人發燒不舒服？

【傳染病防治法第31條】醫療機構人員於病人就診時，應詢問其病史、就醫紀錄、接觸史、旅遊史及其他與傳染病有關之事項；病人或其家屬，應據實陳述。

Traveling

旅遊史

Occupation

工作、職業、
活動範圍

Contact

有無接觸感染者
或蚊蟲動物

Cluster

家人、親友
有無疑似症狀



高雄市政府衛生局 關心您

COVID-19

流感併發重症

登革熱

有症狀 速就醫快篩！！

如出現發燒、呼吸道症狀、骨頭/肌肉痠痛、腹瀉等症狀，



請儘速就醫進行COVID-19、流感、登革熱快篩。

⚠ 提醒醫師落實T.O.C.C.問診，如遇近2週自東南亞/南亞入境或有高風險流行區活動史民眾，請加驗登革熱NS1快篩

登革熱

屈公病

比一比



登革熱

屈公病

傳染途徑

埃及斑蚊、白線斑蚊

病毒血症期

發病前1天至發病後5天

發病前2天至發病後5天

潛伏期

3至8天（最長可達14天）

2至12天，通常為3至7天

相似症狀

發燒、頭痛、出疹、肌肉痛、關節痛

嚴重性

少數個案併發登革出血熱

持續或反覆的嚴重關節痛



預防方法

- 出國要防蚊，穿著長袖衣褲、使用政府核可防蚊液
- 回國後，有症狀速就醫並告知旅遊史
- 居家環境清除孳生源，落實巡倒清刷
- 住家應裝置紗門、紗窗



不用太委屈

這樣做，**屈公病** 不會叮上你



病媒蚊對於
叮咬對象
並無選擇性




屈公病毒
進入社區+
病媒蚊孳生環境



屈公病
流行可能性



清除孳生源是最有效的方法！



- 水桶倒置
- 刷子刷水盆




**巡倒清刷
缺一不可**



**防蚊措施
一個不漏**

- 穿著淺色長袖衣褲
- 使用政府核可
DEET防蚊劑
- 使用紗門、紗窗





旅遊勿忘防蚊

回國不帶屈公病



盛行國家



緬甸



泰國



印度



馬爾地夫

典型症狀



發燒



頭痛



肌肉疼痛



出疹



關節痛

防疫招式



穿著淺色長袖衣褲



使用政府主管機關核可含DEET
或picaridin成份之防蚊藥劑



回國後，有症狀速就醫，並主動
告知旅遊史